

**POLLI DA CARNE****DATI TECNICI**

Consistenza media	46419	n°
Peso medio acquisto	0.04	kg/capo
Peso medio vendita	2.64	kg/capo
Mortalità	5.7	%
Vuoto sanitario per ciclo	11	giorni
Consumo di mangime aziendale (da report)	22.18	kg/capo/anno

**ALIMENTAZIONE PER FASI**

	<b>Durata fase</b>	<b>Proteina grezza mangimi*</b>	<b>Fosforo mangimi*</b>
	<b>giorni</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
- fase 1	10	22.1	0.58
- fase 2	15	20.5	0.52
- fase 3	29	18.5	0.47
- fase 4	0	0	0
- fase 5	0	0	0
- fase 6	0	0	0
Durata ciclo	<b>54</b>		

\* il tenore di proteina grezza e di fosforo è espresso rispetto ad un mangime standard avente un contenuto di sostanza secca pari a 87%

**RISULTATI DI BILANCIO**

<b>Fattore di riduzione azoto escreto</b>	<b>30.4546</b>	%	segno + significa riduzione
<b>Escrezione N (calcolo aziendale)</b>	<b>248.3766</b>	kgN/t peso vivo	
<b>Escrezione N polli da carne</b>	<b>0.2484</b>	kgN/posto/anno	
<b>Escrezione P polli da carne</b>	<b>0.1561</b>	kgP2O5/posto/anno	

**Indici tecnici**

Fattore di correzione kc	<b>5.4553</b>	n. cicli/anno
Variatione di peso vivo	<b>14.1838</b>	kg/capo/anno
Indice di conversione	<b>1.8587</b>	kg/kg t.q.
Consumo di mangime (stima modello)	<b>26.3634</b>	kg/capo/anno

Consumo di mangime (calcolo aziendale)	<b>22.18</b>	kg/capo/anno
Fattore di correzione consumo mangime (aziendale vs modello)	<b>0.8413</b>	
Contenuto medio di PG mangimi	<b>19.7222</b>	% t.q.
Contenuto medio di N mangimi	<b>0.0316</b>	kg/kg t.q.
Contenuto medio di P mangimi	<b>0.005</b>	kg/kg t.q.

### Bilancio dell'azoto, kg/capo/anno

k_Nr avicoli da carne	0.03	kgN/kg carne
k_volatilizzazione	0.3	%
Consumo da modello	<b>0.8331</b>	kgN/capo/anno
Consumo corretto su dato aziendale	<b>0.7009</b>	kgN/capo/anno
Ritenzione	<b>0.4255</b>	kgN/capo/anno
Escrezione (calcolo aziendale)	<b>0.2754</b>	kgN/capo/anno
N al campo (calcolo aziendale)	<b>0.1928</b>	kgN/capo/anno
N al campo da DM 25/02/2016 (peso medio = 1 kg)	0.25	kgN/capo/anno
Escrezione N (calcolo aziendale)	<b>248.3766</b>	kgN/t peso vivo
N al campo da DM 25/02/2016	250	kgN/t peso vivo
Escrezione N da DM 25/02/2016	<b>357.1429</b>	kgN/t peso vivo

N al campo per:

	peso	kgN/capo/anno	kgN/t peso vivo
polli da carne	1.0	0.25	250.0
pollastre	0.8	0.23	288.0
tacchini m.	9.0	1.49	165.0
tacchini f.	4.5	0.76	168.0
faraone	0.8	0.19	240.0

### Bilancio del fosforo, kg/capo/anno

k_Pr avicoli da carne	0.0025	kgP/kg carne
Consumo P (calcolo aziendale)	<b>0.1109</b>	kg/capo/anno
Ritenzione P	<b>0.0355</b>	kg/capo/anno
Escrezione P	<b>0.0754</b>	kg/capo/anno

### Produzione aziendale di Azoto e Fosforo al campo, kg/anno

Produzione N da bilancio aziendale	<b>8949.5832</b>	kg N/anno
N al campo da DM 25/02/16	<b>11604.75</b>	kg N/anno
Produzione P da bilancio aziendale	<b>3499.9926</b>	kg P/anno